

# ANAFLEX PLUS

## RÁPIDA ACCIÓN

Diclofenaco Sódico  
Paracetamol

**Diclofenaco Sódico 25 miligramos**

**Paracetamol 300 miligramos**

**Cápsulas Blandas**

Industria Argentina  
VL Venta Libre

Antiinflamatorio. Analgésico.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN

### ¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 miligramos de Diclofenaco) 25 miligramos; Paracetamol 300 miligramos. Excipientes: Gelatina, Povidona, Propilenglicol, Polietilenglicol, Agua Purificada, Rojo Allura, Sorbitol / Glicerina.

### ACCIONES

Alivia el dolor, desinflama.

**ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN** combina dos sustancias activas que se complementan: Diclofenaco, antiinflamatorio y Paracetamol, analgésico.

### ¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

**ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN** es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento en caso de: alergia a Diclofenaco, Paracetamol, aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales; enfermedades serias del corazón, hígado o riñón; alcoholismo; hemorragias, alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Si Ud. consume algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de utilizar **ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN**.

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

**No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN no debe**

**consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.**

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción en la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

### ¿CÓMO SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

**Adultos y adolescentes a partir de los 15 años de edad:** 1 cápsula blanda cada 8 horas.

**Dosis máxima:** 3 cápsulas blandas por día, repartidas cada 8 horas.

Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años, consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días sin consulta médica.

Si los síntomas no mejoran o empeoran en 3 días, consulte a su médico.

**Modo de administración:** ingerir las cápsulas blandas indistintamente antes, durante o después de una comida ligera, preferentemente con un vaso completo de agua.

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

### PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color rosa.

**Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.**

### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesaria información adicional sobre el producto comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766 o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

[www.anaflex.com.ar](http://www.anaflex.com.ar)

[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

**AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.765.

Fecha de última revisión: Abril/2013.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Provincia de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.



[www.anaflex.com.ar](http://www.anaflex.com.ar)  
[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)  
[www.bagoconsumomasivo.com](http://www.bagoconsumomasivo.com)

**Bagó**

# ANAFLEX

Diclofenaco Dietilamina

C R E M A

Industria Argentina  
VL Venta Libre

**FÓRMULA:** cada 100 g de Crema contiene: Diclofenaco Dietilamina (equivalente a 0,93 g de Diclofenaco) 1,16 g. Excipientes: Imidazolidinilurea; Metilparabeno; Propilparabeno; Carboxipolimetileno; Alcohol Cetoestearílico Etoxilado; Triglicéridos Ácidos Grasos; Vaselina Líquida; Alcohol Isopropílico; Dietilamina; Propilenglicol; Agua Purificada.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** antiinflamatorio y analgésico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, Anaflex Crema no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

**USO EXTERNO**  
Uso del medicamento

**LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.**

**¿Qué es Anaflex Crema?**

Anaflex Crema es un producto de uso externo que contiene Diclofenaco, una sustancia con propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Además, Anaflex Crema tiene como particularidad el ser una crema evanescente no grasa, por lo que no mancha la ropa.

**¿Cuál es la utilidad de Anaflex Crema?**

Anaflex Crema está destinado al alivio local del dolor y la inflamación producida por distensiones musculares y tendinosas, contusiones, traumatismos, esguinces, torceduras. Dolor de origen reumático.

**Cómo usar este medicamento**

**Dosis habitual:** cubrir la zona a tratar con una capa delgada de Anaflex Crema, friccionando suavemente, 3 ó 4 veces por día.

El medicamento es **exclusivamente de uso externo** y sólo deberá utilizarse sobre la piel intacta. Evitar todo contacto con los ojos y las mucosas (bucal, nasal, anal o genital).  
Lavar cuidadosamente las manos después de cada aplicación, salvo que el tratamiento se haya aplicado en las manos. En ese caso, recomendamos tomar precauciones y evitar el posterior contacto con los ojos y las mucosas.

**Antes de utilizar Anaflex Crema, consulte al médico en los siguientes casos:**

Si está embarazada (especialmente a partir del sexto mes) o dando de mamar.  
Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

**Consulte a su médico INMEDIATAMENTE**

Si iniciado el tratamiento se agravan los síntomas, aparecen síntomas nuevos o aumenta el dolor.  
Si al cabo de hasta 5 días nota que el tratamiento no ha tenido efecto favorable.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No utilizar Anaflex Crema sin consulta médica en caso de:

Antecedentes de alergia al principio activo o a alguno de los componentes de la formulación, así como al ácido acetilsalicílico (aspirina) o algún otro antiinflamatorio no esteroide.

Niños menores de 6 años.

Heridas u otras lesiones de la piel (por ej. eccemas, lesiones cutáneas infectadas o supuradas).

Aplicación sobre zonas extensas por tiempo prolongado.

En personas hipersusceptibles pueden llegar a presentarse trastornos leves como prurito, rubefacción, erupción cutánea, escozor, que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento.

No existe evidencia de que la aplicación de Anaflex Crema influya sobre otros medicamentos utilizados conjuntamente.

**SOBREDOSIFICACIÓN**

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**PRESENTACIÓN:** Envases conteniendo 70 g y 125 g de Crema.

**OTRAS PRESENTACIONES:** Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas de Rápida Acción.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, ANAFLEX DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado Nro. 38.872.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disposición Nro. 0248/03.  
Elaborado en Coronel Mendez 438/40. Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires.  
Legajo Nro. 7198.

**Laboratorios Bagó S.A.**

Investigación y Tecnología Argentina

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

960 079 C

ANTIINFLAMATORIO  
ANALGÉSICO

[www.anaflex.com.ar](http://www.anaflex.com.ar)  
[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)  
[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

VL VENTA LIBRE

**Bagó**

51000277