

ANAFLEX PLUS

RÁPIDA ACCIÓN

Diclofenaco Sódico
Paracetamol

Diclofenaco Sódico 25 miligramos

Paracetamol 300 miligramos

Cápsulas Blandas

Industria Argentina
VL Venta Libre

Antiinflamatorio. Analgésico.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR **ANAFLEX PLUS** RÁPIDA ACCIÓN

¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 miligramos de Diclofenaco) 25 miligramos; Paracetamol 300 miligramos. Excipientes: Gelatina, Povidona, Propilenglicol, Polietilenglicol, Agua Purificada, Rojo Allura, Sorbitol / Glicerina.

ACCIONES

Alivia el dolor, desinflama.

ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN combina dos sustancias activas que se complementan: Diclofenaco, antiinflamatorio y Paracetamol, analgésico.

¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento en caso de: alergia a Diclofenaco, Paracetamol, aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales; enfermedades serias del corazón, hígado o riñón; alcoholismo; hemorragias, alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Si Ud. consume algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de utilizar **ANAFLEX PLUS** RÁPIDA ACCIÓN.

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN no debe

consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción en la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

¿CÓMO SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Adultos y adolescentes a partir de los 15 años de edad: 1 cápsula blanda cada 8 horas.

Dosis máxima: 3 cápsulas blandas por día, repartidas cada 8 horas.

Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años, consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días sin consulta médica.

Si los síntomas no mejoran o empeoran en 3 días, consulte a su médico.

Modo de administración: ingerir las cápsulas blandas indistintamente antes, durante o después de una comida ligera, preferentemente con un vaso completo de agua.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color rosa.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesaria información adicional sobre el producto comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766 o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.anaflex.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.765.

Fecha de última revisión: Abril/2013.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Provincia de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.



www.anaflex.com.ar
www.bago.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com

Bagó

ANAFLEX

Diclofenaco Sódico

Diclofenaco Sódico 25 miligramos Cápsulas Blandas

Industria Argentina
VL Venta Libre

ACCIÓN TERAPÉUTICA Antiinflamatorio. Analgésico.

FÓRMULA

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 mg de Diclofenaco) 25 miligramos.
Excipientes: Polietilenglicol; Agua Purificada; Povidona; Propilenglicol; Sorbitol / Glicerina; Amarillo de Quinolina W.S.; Gelatina.

No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, ANAFLEX no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

USO ADECUADO DE ANAFLEX LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

¿Qué es ANAFLEX? ANAFLEX Cápsulas Blandas es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

¿Cómo se usa ANAFLEX?

Dosis habitual: adultos y niños mayores de 15 años:

ANAFLEX 1 cápsula blanda 3 veces por día (cada 8 horas).
Dolor menstrual: **ANAFLEX** 1 cápsula 1 ó 2 veces por día.

- Ingerir las cápsulas blandas preferentemente después de las comidas.
- **Dosis máxima:** 3 cápsulas blandas de 25 mg (75 mg de Diclofenaco Sódico 25 miligramos por día).
- **Mayores de 65 años:** consulte con su médico.
- **Niños menores de 15 años:** consulte con su médico.
- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de los síntomas o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
 - No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar **ANAFLEX** en caso de:

- Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte con su médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias.

- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias.
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón.
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante.
- Tratamiento intensivo con diuréticos.
- Insuficiencia hepática o renal.
- Embarazo o lactancia.
- Menores de 15 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión de **ANAFLEX**.

Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.

Antes de utilizar **ANAFLEX** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Ante la duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ej. náuseas, vómitos, diarrea / constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777,
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color amarillo.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **ANAFLEX** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. S0.778.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 3308/07.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella, Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

S0999374

ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO

Cápsulas Blandas de **rápida acción**

www.anaflex.com.ar
www.bago.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com.ar

VL VENTA LIBRE

Bagó

ANAFLEX

Diclofenaco Dietilamina

C R E M A

Industria Argentina
VL Venta Libre

FÓRMULA: cada 100 g de Crema contiene: Diclofenaco Dietilamina (equivalente a 0,93 g de Diclofenaco) 1,16 g. Excipientes: Imidazolidinilurea; Metilparabeno; Propilparabeno; Carboxipolimetileno; Alcohol Cetoestearílico Etoxilado; Triglicéridos Ácidos Grasos; Vaselina Líquida; Alcohol Isopropílico; Dietilamina; Propilenglicol; Agua Purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: antiinflamatorio y analgésico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, Anaflex Crema no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

USO EXTERNO
Uso del medicamento

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

¿Qué es Anaflex Crema?

Anaflex Crema es un producto de uso externo que contiene Diclofenaco, una sustancia con propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Además, Anaflex Crema tiene como particularidad el ser una crema evanescente no grasa, por lo que no mancha la ropa.

¿Cuál es la utilidad de Anaflex Crema?

Anaflex Crema está destinado al alivio local del dolor y la inflamación producida por distensiones musculares y tendinosas, contusiones, traumatismos, esguinces, torceduras. Dolor de origen reumático.

Cómo usar este medicamento

Dosis habitual: cubrir la zona a tratar con una capa delgada de Anaflex Crema, friccionando suavemente, 3 ó 4 veces por día.

El medicamento es **exclusivamente de uso externo** y sólo deberá utilizarse sobre la piel intacta. Evitar todo contacto con los ojos y las mucosas (bucal, nasal, anal o genital).
Lavar cuidadosamente las manos después de cada aplicación, salvo que el tratamiento se haya aplicado en las manos. En ese caso, recomendamos tomar precauciones y evitar el posterior contacto con los ojos y las mucosas.

Antes de utilizar Anaflex Crema, consulte al médico en los siguientes casos:

Si está embarazada (especialmente a partir del sexto mes) o dando de mamar.
Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier medicamento.

Consulte a su médico INMEDIATAMENTE

Si iniciado el tratamiento se agravan los síntomas, aparecen síntomas nuevos o aumenta el dolor.
Si al cabo de hasta 5 días nota que el tratamiento no ha tenido efecto favorable.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar Anaflex Crema sin consulta médica en caso de:

Antecedentes de alergia al principio activo o a alguno de los componentes de la formulación, así como al ácido acetilsalicílico (aspirina) o algún otro antiinflamatorio no esteroide.

Niños menores de 6 años.

Heridas u otras lesiones de la piel (por ej. eccemas, lesiones cutáneas infectadas o supuradas).

Aplicación sobre zonas extensas por tiempo prolongado.

En personas hipersusceptibles pueden llegar a presentarse trastornos leves como prurito, rubefacción, erupción cutánea, escozor, que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento.

No existe evidencia de que la aplicación de Anaflex Crema influya sobre otros medicamentos utilizados conjuntamente.

SOBREDOSIFICACIÓN

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 70 g y 125 g de Crema.

OTRAS PRESENTACIONES: Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas de Rápida Acción.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, ANAFLEX DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nro. 38.872.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disposición Nro. 0248/03.
Elaborado en Coronel Mendez 438/40. Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires.
Legajo Nro. 7198.

Laboratorios Bagó S.A.

Investigación y Tecnología Argentina

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

960 079 C

ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO

www.anaflex.com.ar
www.bago.com.ar
www.bagoconsumomaslivo.com.ar

VL VENTA LIBRE

Bagó

51000277