ANTISÉPTICO Y CICATRIZANTE

Acexamato Cetrimida



Crema reparadora de la piel dañada

Acción Terapéutica:

Antiséptico y cicatrizante. Reparador de la piel dañada.

Fórmula: Cada 100 g de Bagóderm Crema contienen: Acexamato de Sodio 5 g, Cetrimida 1 g. Excipientes: Espermaceti A, Alcohol Estearílico, Alcoholes Grasos Autoemulsionables, Propilenglicol, Imidazolidinilurea, Agua Purificada c.s.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **BAGÓDERM** Crema no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

USO EXTERNO

CONSERVAR AL ABRIGO DEL CALOR (NO MAYOR DE 30°C).

Uso del medicamento:

Lea detenidamente esta información

¿Oué es **BAGÓDERM** Crema?

BAGÓDERM Crema es un producto de uso externo antiséptico y cicatrizante. Contiene como sustancias activas Cetrimida, un compuesto con efecto antibacteriano y Acexamato, un promotor y acelerador de la cicatrización, en una formulación suavizante y protectora de la piel.

¿Cuándo utilizar BAGÓDERM Crema?

- Quemaduras.
- Raspaduras.
- Úlceras, escaras, etc.
- Grietas del pezón.
- Irritación de la piel en la zona del pañal (dermatitis del pañal).

Ante la duda consulte a su médico.

¿Cómo usar BAGÓDERM Crema?

- Quemaduras, raspaduras, escaras, úlceras:
- 2 a 4 aplicaciones diarias.

Cuando fuese necesario, realizar la limpieza previa de la zona afectada (para eliminar secreciones y/o costras).

• Grietas del pezón:

2 a 4 aplicaciones diarias.

Aplicar masajeando suavemente cada pezón luego de amamantar.

Higienizar cuidadosamente la zona, antes de colocar el bebé al pecho, para eliminar todo resto del medicamento

• Dermatitis del pañal:

Aplicar una cantidad suficiente de crema sobre la zona afectada, con el cambio de cada pañal.

Si en un plazo de 5 días no se aprecia mejoría, o ante cualquier duda, se aconseja consultar a su médico.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia a alguno de sus componentes.

Advertencias y Precauciones:

A las dosis recomendadas **BAGÓDERM** Crema es generalmente bien tolerado y no produce efectos colaterales ni secundarios.

En pacientes hipersusceptibles puede producir la aparición de eccema de contacto, sobre todo con el uso prolongado.

Exclusivamente de uso externo. Evitar contacto con los ojos y cavidades mucosas.

Sobredosificación:

Ante la ingestión accidental, comunicarse con un Centro de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247;
- Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115;
- Hospital Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación: Envase conteniendo 50 gramos.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓDERM** CREMA DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente.

Certificado Nro.: 33.773.

Prospecto autorizado por la ANMAT Disp. Nro.: 1357/05.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Laboratorios Bagó S.A.

Investigación y Tecnología Argentina Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19. Director Técnico: Julio C. Marangoni. Farmacéutico. Calle 4 Nro.1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

Venta Libre Industria Argentina



960 016 A