

PROYECTO DE PROSPECTO

Actual

Famotidina 10 miligramos

Carbonato de Calcio 800 miligramos

Hidróxido de Magnesio 165 miligramos

Comprimidos Masticables



Industria Argentina

VL Venta Libre

Antiácido. Reductor de la producción de ácido estomacal

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE ACTUAL?

Cada Comprimido Masticable contiene: Famotidina 10 miligramos, Carbonato de Calcio 800 miligramos, Hidróxido de Magnesio 165 miligramos. Excipientes: Etilcelulosa, Alcohol Cetílico, Esencia de Limón, Esencia de Menta, Povidona, Almidón de Maíz Pregelatinizado, Laurilsulfato de Sodio, Sucralosa, Celulosa Microcristalina, Manitol, Estearato de Magnesio, Sorbitol Polvo.

Este medicamento es Libre de Gluten

No contiene azúcar. No contiene lactosa.

ACCIONES

Actual presenta una doble acción en 1 sólo Comprimido Masticable:

- ANTIÁCIDO, mediante el Carbonato de Calcio e Hidróxido de Magnesio que reducen instantáneamente la acidez del estómago.
- REDUCTOR DE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO, mediante la Famotidina, efecto que dura aproximadamente 12 horas.

¿PARA QUÉ SE USA ACTUAL?

Actual se utiliza para el alivio sintomático de la acidez estomacal en adultos y niños a partir de los 16 años de edad.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ACTUAL?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes del producto, particularmente a la Famotidina o a otros fármacos reductores del ácido. Menores de 16 años.

No utilizar **Actual** con otros productos que contengan Famotidina o reductores del ácido.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico si usted tiene: dificultad o dolor al tragar los alimentos, vómitos reiterados o con sangre, materia fecal con sangre o de color negro, dolor en el pecho que se

propaga a los brazos, dificultad para respirar acompañada de acidez, pérdida de peso sin causa que la explique o problemas en el funcionamiento de su hígado.

Si usted presenta insuficiencia renal moderada o grave, su médico podría modificar la dosis.

Actual contiene calcio. Si está tomando un medicamento con calcio, tiene antecedentes de exceso de calcio en la sangre o en la orina, de bajos niveles de fósforo en la sangre o de cálculos en el riñón consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración.

Actual no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Advertencia sobre excipientes

Sorbitol / fructosa

Este medicamento contiene Sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento; suspenda la medicación y consulte con su médico si aparecen alguno de los siguientes: palpitations, hematomas, cansancio, ansiedad, constipación, somnolencia, hinchazón del abdomen, sensación de plenitud, sequedad en la boca, dolores articulares y musculares, náuseas, vómitos, picazón y erupción en la piel.

En algunos casos de insuficiencia renal moderada a severa, se han descrito efectos adversos neurológicos.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece cualquier síntoma que le impresione relacionado al uso del producto, que le ocasione preocupación o que le parezca poco usual.

Si el dolor estomacal persiste por más de 7 días o empeora deje de utilizar Actual y consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Dosis: adultos y niños mayores de 16 años:

- masticar completa y lentamente 1 Comprimido Masticable de **Actual** y luego ingerirlo, una a dos veces por día.
- no ingiera más de 2 Comprimidos Masticables de **Actual** en 24 horas.
- no tragar el Comprimido sin masticarlo primero.
- se puede utilizar en el momento en el que aparecen los síntomas, antes de las comidas o antes de acostarse.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología por ejemplo:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 1, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 24, 25, 30 y 50 Comprimidos Masticables y envases tipo Dispenser conteniendo 70, 100, 150, 200 y 300 Comprimidos Masticables.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.consumomasivo.bago.com.ar

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 52.268.
Prospecto autorizado por ANMAT Disp. Nro.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda
CUIL 27177154259

