

## PROYECTO DE PROSPECTO

# Anaflex

## Paracetamol 500 miligramos

### Comprimidos

### Vía de administración oral

Industria Argentina  
VL Venta Libre



### Analgésico. Antifebril

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

#### ¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX?

Cada Comprimido contiene: Paracetamol 500 miligramos. Excipientes: Almidón Pregelatinizado; Povidona; Almidón Glicolato de Sodio; Ácido Esteárico.

**Este Medicamento es Libre de Gluten**

#### ACCIONES

Analgésico. Antifebril.

#### ¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX?

**Anaflex** es un medicamento que se utiliza para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y reducir la fiebre.

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX?

Alergia conocida al Paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos. antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria, o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente.

**Anaflex** Comprimidos no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo. Enfermedad del riñón, corazón o pulmones. Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina). Menores de 12 años.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

El Paracetamol puede causar daño hepático cuando se ingiere en altas dosis.

No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado “¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?”.

IF-2025-63296808-APN-DE#ANMAT

PP ANA 500 Com V01

1

Página 1 de 3

Página 1 de 36

  
Ética al servicio de la salud

Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol u otro analgésico.

Se ha notificado una enfermedad grave denominada acidosis metabólica (una anomalía en la sangre y los líquidos) en pacientes que padecen enfermedades graves, como insuficiencia renal severa o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daños en los órganos), o que padecen malnutrición, alcoholismo crónico, cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con un antibiótico llamado flucloxacilina. Los síntomas de acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, sensación de malestar (náuseas) y vómitos, si presenta alguno de estos síntomas consulte a su médico.

El Paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: anticoagulantes orales (utilizados para evitar la coagulación de la sangre); antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida y rifampicina (utilizados para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antiinfecciosos; no utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor). Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta los derivados de hierbas.

Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

**No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Anaflex no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece en el dorso del envase.**

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (8 comprimidos de 500 mg). Pacientes mayores a 65 años y niños menores: consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, en estos casos suspenda la medicación y consulte a su médico.

Ingerir los Comprimidos de **Anaflex** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

IF-2025-31296808-APN-DEMA#ANMAT

## **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.*

## **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 10, 20, 30 Comprimidos color blanco. Envases expendedores para fraccionar en Farmacias conteniendo 100, 200, 300 y 400 Comprimidos color blanco en blisters con su prospecto

## **FORMA DE CONSERVACIÓN**

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.**

## **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

**Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / [soibago@bago.com.ar](mailto:soibago@bago.com.ar) o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.**

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

## **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 11.599.  
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Elaborado en: calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

## **LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.  
Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208

PP ANA 500 Com V01

3

Página 3 de 3

IF-2025-61296808-APN-DEMA#ANMAT

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

Página 3 de 36

## PROYECTO DE PROSPECTO

# Anaflex Forte

## Paracetamol 650 miligramos

### Comprimidos

### Vía de administración oral

Industria Argentina  
*VL VENTA LIBRE*



### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

#### ¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX FORTE?

Cada Comprimido contiene: Paracetamol 650 miligramos. Excipientes: Almidón Pregelatinizado; Povidona; Almidón Glicolato de Sodio; Ácido Esteárico.

**Este Medicamento es Libre de Gluten**

#### ACCIONES

Analgésico. Antifebril.

#### ¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX FORTE?

**Anaflex Forte** es un medicamento que se utiliza para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares, articulares, dentales leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX FORTE?

Alergia conocida al Paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria, o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. **Anaflex Forte** Comprimidos no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo. Enfermedad del riñón, corazón o pulmones. Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina). Menores de 12 años.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

El Paracetamol puede causar daño hepático cuando se ingiere en altas dosis.

No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado “¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?”.

Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol u otro analgésico. RE-2025-42114017-APN-DTD#JGM

Se ha notificado una enfermedad grave denominada acidosis metabólica (una anomalía en la sangre y los líquidos) en pacientes que padecen enfermedades graves, como insuficiencia renal severa o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daños en los órganos), o que padecen malnutrición, alcoholismo crónico, cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con un antibiótico llamado flucloxacilina. Los síntomas de acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, sensación de malestar (náuseas) y vómitos, si presenta alguno de estos síntomas consulte a su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

El Paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: anticoagulantes orales (utilizados para evitar la coagulación de la sangre); antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida y rifampicina (utilizados para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antiinfecciosos; no utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor).

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

**No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Anaflex Forte no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece al dorso del envase.**

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (6 comprimidos de 650 mg).

Pacientes mayores a 65 años y niños menores de 12 años: consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, en estos casos suspenda la medicación y consulte a su médico.

Ingerir los comprimidos de **Anaflex Forte** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

RE-2025-42114017-APN-DTD#JGM

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.*

## **PRESENTACIONES**

Envases con 10 y 20 Comprimidos.

## **FORMA DE CONSERVACIÓN**

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.**

## **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

**Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / [soibago@bago.com.ar](mailto:soibago@bago.com.ar) o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.**

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

## **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 11.599.  
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.



*Ética al servicio de la salud*

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

RE-2025-42114017-APN-DTD#JGM

Página 31 de 34



DD ANA FTE Com V01

2

IF-2025-80935954-APN-DERM#ANMAT

Página 3 de 3

# Anaflex Plus Rápida Acción

Diclofenaco Sódico 25 miligramos

Paracetamol 300 miligramos

Cápsulas Blandas

Vía de administración oral

Industria Argentina

VL Venta Libre

**Antiinflamatorio. Analgésico.**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN**

## ¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 miligramos de Diclofenaco) 25 miligramos; Paracetamol 300 miligramos. Excipientes: Gelatina, Povidona, Propilenglicol, Polietilenglicol 400, Agua Purificada, Rojo Allura, Sorbitol/Glicerina.

## ACCIONES

Alivia el dolor, desinflama.

**Anaflex Plus Rápida Acción** combina dos sustancias activas que se complementan: Diclofenaco, antiinflamatorio y Paracetamol, analgésico.

## ¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

**Anaflex Plus Rápida Acción** es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

## ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento en caso de: alergia a Diclofenaco, Paracetamol, aspirina u otros analgésicos/antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales; enfermedades serias del corazón, hígado o riñón; alcoholismo; hemorragias, alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Si Ud. consume algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de utilizar **Anaflex Plus Rápida Acción**.

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

**No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Anaflex Plus Rápida Acción no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.**

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo: náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción en la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

Se ha notificado una enfermedad grave denominada acidosis metabólica (una anomalía en la sangre y los líquidos) en pacientes que padecen enfermedades graves, como insuficiencia renal severa o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daños en los órganos), o que padecen malnutrición, alcoholismo crónico, cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con un antibiótico llamado flucloxacilina. Los síntomas de acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, sensación de malestar (náuseas) y vómitos, si presenta alguno de estos síntomas consulte a su médico.

### **¿CÓMO SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?**

**Adultos y adolescentes a partir de los 15 años de edad:** 1 cápsula blanda cada 8 horas.

**Dosis máxima:** 3 cápsulas blandas por día, repartidas cada 8 horas.

Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años, consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días sin consulta médica.

Si los síntomas no mejoran o empeoran en 3 días, consulte a su médico.

**Modo de administración:** ingerir las cápsulas blandas indistintamente antes, durante o después de una comida ligera, preferentemente con un vaso completo de agua.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

### **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color rosa.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.**

### **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

**Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.**

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

PP ANP CpB V01

2

RE-20235437669239A-ANDEFM#ANMAT

**Bago**

Ética al servicio de la salud

[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O  
FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.765.  
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Elaborado en: Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

**△ Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Argentina. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208 NP CpB V01

3

RE 202035437668439A ANDE RDM # ANMAT

**△ Bagó**

*Ética al servicio de la salud*